

Bilaga till rapport 2009:24

Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa
inom vård och omsorg

Karolinska Institutets folkhälsoakademi

På uppdrag av
Stockholms läns landsting



**Karolinska
Institutet**

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa gick över till Karolinska Institutet (KI).

KFA bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. En grundtanke är att praktik och teori ska stimulera varandra och ge synergieffekter, till nytta för vården och befolkningen. KFA ska vara en plattform för utveckling av metoder och redskap samt för en bred implementering av åtgärder för att förbättra befolkningens hälsa.

Målet är att vara ett regionalt, nationellt och internationellt kunskapsnav som förstärker de folkhälsovetenskapliga inslagen i medicinsk utbildning och forskning samt i det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. Visionen är att ha en sådan ämnesmässig bredd och kvalitet att KFA räknas till en av de främsta folkhälsoakademierna i världen.

KFA:s långsiktiga arbete leds av styrelse och en föreståndare som samordnar, stimulerar och utvecklar folkhälsovetenskapen vid KI, i samverkan med KI:s övriga beslutande organ. Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Karolinska Institutets folkhälsoakademi
171 77 Stockholm

E-post: info@kfa.ki.se
Telefon: 08-524 800 00
www.ki.se/kfa

Bilagan kan laddas ner från
Folkhälsoguiden, www.folkhalsoguiden.se

Tabell 3a. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andel (%) individer med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor uppdelat på kön bland anställda inom vård och omsorg jämfört med anställda inom annat yrkesområde justerat för åldersklass och socioekonomisk indelning. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen som rapporterar nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden eller ohälsosamma levnadsvanor i en aspekt är signifikant fler respektive färre bland vård- och omsorgsanställda jämfört med övriga yrkesarbetande.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) och socioekonomisk indelning uppdelat på män och kvinnor där anställda inom vård- och omsorg jämförs med anställda inom annat yrkesområde.				
	Kvinnor		Män		
	Vård/omsorg	Annat yrkesområde	Vård/omsorg	Annat yrkesområde	
Hälsa					
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=1897) 1.02 (1.00-1.04)	(n=10451) 1	(n=366) 1.35 (1.31-1.40)	(n=9757) 1	
Ihållande trötthet	(n=1863) 1.05 (1.04-1.06)	(n=10253) 1	(n=363) 1.17 (1.15-1.20)	(n=9617) 1	
Sömnsvårigheter	(n=1867) 1.05 (1.04-1.06)	(n=10261) 1	(n=363) 1.24 (1.21-1.27)	(n=9619) 1	
Oro/nedstämdhet	(n=1841) 1.03 (1.02-1.04)	(n=10192) 1	(n=348) 1.18 (1.16-1.21)	(n=9417) 1	
Stressymptom	(n=1916) 0.92 (0.91-0.93)	(n=10550) 1	(n=371) 1.21 (1.18-1.24)	(n=9868) 1	
Smärtor/besvär ²	(n=1837) 1.01 (1.00-1.02)	(n=10210) 1	(n=344) 0.97 (0.95-0.99)	(n=9422) 1	
Värk i rörelseorganen	(n=1901) 0.94 (0.93-0.95)	(n=10522) 1	(n=369) 0.86 (0.83-0.89)	(n=9851) 1	
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=1811) 1.05 (1.04-1.07)	(n=9790) 1	(n=349) 1.15 (1.12-1.18)	(n=9219) 1	
Arbetsförhållanden					
Högstressarbete	(n=1771) 1.26 (1.22-1.30)	(n=9702) 1	(n=342) 1.66 (1.58-1.76)	(n=9181) 1	
Lågt stöd från överordnade	(n=1717) 1.12 (1.10-1.14)	(n=9176) 1	(n=327) 1.24 (1.20-1.28)	(n=8141) 1	
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=1722) 1.12 (1.08-1.15)	(n=9266) 1	(n=325) 0.80 (0.75-0.85)	(n=8500) 1	
Låg belöning	(n=1794) 1.12 (1.11-1.13)	(n=9780) 1	(n=344) 1.25 (1.23-1.27)	(n=9182) 1	
Omfattande omorganisationer	(n=1535) 1.09 (1.08-1.09)	(n=8532) 1	(n=291) 1.03 (1.01-1.04)	(n=8189) 1	
Upprepad sjuknärvaro	(n=1795) 0.95 (0.94-0.96)	(n=9850) 1	(n=349) 0.98 (0.97-1.00)	(n=9259) 1	
Tungt kroppsligt arbete	(n=1803) 1.71 (1.67-1.75)	(n=9822) 1	(n=344) 0.72 (0.69-0.75)	(n=9222) 1	
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=1804) 1.10 (1.07-1.12)	(n=9873) 1	(n=350) 1.47 (1.42-1.52)	(n=9271) 1	
Levnadsvanor					
Daglig rökning	(n=1904) 0.93 (0.91-0.94)	(n=10545) 1	(n=370) 1.15 (1.11-1.19)	(n=9875) 1	
Fysisk inaktivitet	(n=1910) 0.96 (0.95-0.96)	(n=10522) 1	(n=368) 0.85 (0.84-0.86)	(n=9843) 1	
Hög alkoholkonsumtion	(n=1693) 0.97 (0.94-1.00)	(n=9688) 1	(n=337) 0.82 (0.79-0.84)	(n=9293) 1	

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 3b. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andel (%) män jämfört med andel (%) kvinnor med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor bland anställda inom vård och omsorg justerat för åldersklass och socioekonomisk indelning. Rödmärkerad respektive grönmärkerad kvot indikerar att andelen som rapporterar nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden eller ohälsosamma levnadsvanor i en aspekt är signifikant fler respektive färre bland män jämfört med kvinnor.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) och socioekonomisk indelning där kvinnor anställda inom vård- och omsorg jämförs med män anställda inom vård- och omsorg.	
	Kvinnor	Män
Hälsa		
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=1897) 1.13 (1.10-1.17)	(n=366) 1
Ihållande trötthet	(n=1863) 1.33 (1.30-1.36)	(n=363) 1
Sömnsvårigheter	(n=1867) 1.11 (1.08-1.14)	(n=363) 1
Oro/nedstämdhet	(n=1841) 1.19 (1.16-1.22)	(n=348) 1
Stress	(n=1916) 1.21 (1.18-1.24)	(n=371) 1
Smärtor/besvär ²	(n=1837) 1.26 (1.24-1.29)	(n=344) 1
Rörelseorgansbesvär	(n=1901) 1.70 (1.64-1.76)	(n=369) 1
Upprepad korttidssjukfrånvaro	(n=1811) 1.11 (1.08-1.15)	(n=349) 1
Arbetsförhållanden		
Högstressarbete	(n=1771) 0.78 (0.74-0.83)	(n=342) 1
Lågt stöd från överordnade	(n=1717) 0.96 (0.92-0.99)	(n=327) 1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=1722) 1.12 (1.04-1.20)	(n=325) 1
Låg belöning	(n=1794) 0.92 (0.90-0.94)	(n=344) 1
Omfattande omorganisationer	(n=1535) 1.07 (1.05-1.09)	(n=291) 1
Upprepad sjuknärvaro	(n=1795) 1.05 (1.03-1.07)	(n=349) 1
Tungt kroppsligt arbete	(n=1803) 1.34 (1.29-1.41)	(n=344) 1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=1804) 1.02 (0.98-1.06)	(n=350) 1
Levnadsvanor		
Daglig rökning	(n=1904) 1.04 (1.00-1.08)	(n=370) 1
Fysisk inaktivitet	(n=1910) 1.23 (1.21-1.25)	(n=368) 1
Hög alkoholkonsumtion	(n=1693) 0.47 (0.45-0.49)	(n=337) 1

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 4a. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som justerat för åldersklass visar kvoten mellan andel (%) kvinnor med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor bland anställda i en specifik yrkesgrupp med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård och omsorg jämfört med kvinnor inom annat yrkesområde med motsvarande socioekonomisk tillhörighet. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen som rapporterar nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden eller ohälsosamma levnadsvanor i en aspekt är signifikant fler respektive färre i den specifika yrkesgruppen med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård- och omsorg jämfört med övriga yrkesarbetande med motsvarande socioekonomisk tillhörighet.

		PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) där kvinnor inom tre yrkesgrupper jämförs med kvinnor inom annat yrkesområde i motsvarande socioekonomisk grupp.										
		Kvinnor										
		Omvårdn/omsorg	Övriga arbetare	Sjuksköterskor	Övriga mellantj	Läkare	Övriga högre tj					
Hälsa												
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=1163)	1.02 (1.00-1.04)	(n=1942)	1	(n=354)	0.95 (0.91-0.98)	(n=2800)	1	(n=105)	1.26 (1.20-1.32)	(n=2226)	1
Ihållande trötthet	(n=1136)	1.02 (1.01-1.03)	(n=1892)	1	(n=348)	0.97 (0.95-0.99)	(n=2758)	1	(n=107)	1.30 (1.25-1.34)	(n=2193)	1
Sömnsvårigheter	(n=1134)	1.03 (1.02-1.05)	(n=1889)	1	(n=351)	1.08 (1.06-1.10)	(n=2759)	1	(n=108)	1.37 (1.33-1.42)	(n=2204)	1
Oro/nedstämdhet	(n=1121)	1.04 (1.02-1.05)	(n=1887)	1	(n=343)	1.00 (0.98-1.03)	(n=2742)	1	(n=104)	1.09 (1.04-1.13)	(n=2151)	1
Stresssymptom	(n=1176)	0.87 (0.85-0.88)	(n=1957)	1	(n=355)	0.79 (0.77-0.81)	(n=2829)	1	(n=108)	1.55 (1.51-1.60)	(n=2247)	1
Smärtor/besvär ²	(n=1113)	0.99 (0.98-1.00)	(n=1895)	1	(n=346)	0.94 (0.92-0.96)	(n=2748)	1	(n=104)	1.30 (1.26-1.34)	(n=2154)	1
Värk i rörelseorganen	(n=1167)	0.92 (0.91-0.94)	(n=1949)	1	(n=351)	0.85 (0.83-0.88)	(n=2822)	1	(n=107)	1.04 (0.99-1.10)	(n=2235)	1
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=1090)	1.10 (1.08-1.12)	(n=1770)	1	(n=348)	1.03 (1.00-1.06)	(n=2709)	1	(n=105)	0.90 (0.85-0.96)	(n=2169)	1
Arbetsförhållanden												
Högstressarbete	(n=1058)	1.16 (1.11-1.22)	(n=1722)	1	(n=343)	1.11 (1.03-1.20)	(n=2663)	1	(n=105)	3.95 (3.65-4.27)	(n=2146)	1
Lågt stöd från överordnade	(n=1042)	1.18 (1.15-1.21)	(n=1696)	1	(n=339)	1.16 (1.12-1.21)	(n=2646)	1	(n=103)	0.75 (0.68-0.81)	(n=2068)	1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=1029)	1.05 (1.01-1.10)	(n=1683)	1	(n=342)	0.86 (0.79-0.92)	(n=2640)	1	(n=104)	1.63 (1.48-1.79)	(n=2090)	1
Låg belöning	(n=1078)	1.05 (1.03-1.06)	(n=1755)	1	(n=345)	1.25 (1.23-1.28)	(n=2688)	1	(n=104)	1.25 (1.21-1.30)	(n=2144)	1
Omfattande omorganisationer	(n=878)	1.10 (1.09-1.12)	(n=1365)	1	(n=317)	1.04 (1.03-1.06)	(n=2444)	1	(n=94)	1.15 (1.13-1.18)	(n=1959)	1
Upprepad sjuknärvaro	(n=1080)	0.98 (0.97-0.99)	(n=1761)	1	(n=343)	0.92 (0.90-0.93)	(n=2688)	1	(n=106)	1.25 (1.22-1.28)	(n=2163)	1
Tungt kroppsligt arbete	(n=1084)	1.51 (1.48-1.55)	(n=1750)	1	(n=345)	2.90 (2.68-3.15)	(n=2684)	1	(n=105)	3.39 (2.63-4.36)	(n=2161)	1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=1085)	1.15 (1.11-1.19)	(n=1769)	1	(n=344)	0.84 (0.80-0.88)	(n=2693)	1	(n=106)	2.04 (1.95-2.14)	(n=2166)	1
Levnadsvanor												
Daglig rökning	(n=1166)	0.97 (0.95-0.99)	(n=1952)	1	(n=356)	0.88 (0.84-0.92)	(n=2828)	1	(n=108)	0.42 (0.36-0.49)	(n=2246)	1
Fysisk inaktivitet	(n=1174)	0.98 (0.97-0.99)	(n=1952)	1	(n=354)	1.00 (0.99-1.02)	(n=2818)	1	(n=107)	1.00 (0.97-1.03)	(n=2248)	1
Hög alkoholkonsumtion	(n=1010)	1.13 (1.10-1.17)	(n=1716)	1	(n=318)	0.75 (0.68-0.82)	(n=2629)	1	(n=103)	a	(n=2132)	1

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av en ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 4b. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som justerat för åldersklass visar kvoten mellan andel (%) män med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor i en specifik yrkesgrupp med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård och omsorg jämfört med män inom annat yrkesområde med motsvarande socioekonomisk tillhörighet. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen som rapporterar nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden eller ohälsosamma levnadsvanor i en aspekt är signifikant fler respektive färre i den specifika yrkesgruppen med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård- och omsorg jämfört med övriga yrkesarbetande med motsvarande socioekonomisk tillhörighet.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) där män inom två yrkesgrupper jämförs med anställda inom annat yrkesområde i motsvarande socioekonomisk grupp.							
	Män							
	Omvårdn/omsorg		Övriga arbetare		Läkare		Övriga högre tj	
Hälsa								
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=207)	1.50 (1.44-1.56)	(n=2668)	1	(n=85)	1.04 (0.96-1.13)	(n=2399)	1
Ihållande trötthet	(n=205)	1.05 (1.02-1.08)	(n=2614)	1	(n=83)	1.52 (1.45-1.60)	(n=2387)	1
Sömnsvårigheter	(n=205)	1.28 (1.24-1.31)	(n=2606)	1	(n=83)	1.39 (1.33-1.45)	(n=2392)	1
Oro/nedstämdhet	(n=197)	1.24 (1.20-1.27)	(n=2584)	1	(n=79)	1.17 (1.10-1.24)	(n=2276)	1
Stresssymptom	(n=210)	1.10 (1.06-1.14)	(n=2701)	1	(n=86)	1.44 (1.38-1.51)	(n=2416)	1
Smärtor/besvär ²	(n=191)	0.84 (0.82-0.87)	(n=2582)	1	(n=81)	0.94 (0.89-0.99)	(n=2279)	1
Värk i rörelseorganen	(n=210)	0.74 (0.71-0.77)	(n=2698)	1	(n=84)	1.09 (1.01-1.18)	(n=2235)	1
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=190)	1.21 (1.17-1.25)	(n=2709)	1	(n=86)	1.17 (1.09-1.26)	(n=2340)	1
Arbetsförhållanden								
Högstressarbete	(n=185)	1.64 (1.54-1.75)	(n=2442)	1	(n=85)	3.92 (3.54-4.34)	(n=2322)	1
Lågt stöd från överordnade	(n=185)	1.16 (1.11-1.21)	(n=2394)	1	(n=76)	1.48 (1.37-1.59)	(n=2113)	1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=177)	0.77 (0.70-0.84)	(n=2378)	1	(n=78)	1.31 (1.19-1.46)	(n=2187)	1
Låg belöning	(n=188)	1.21 (1.18-1.23)	(n=2460)	1	(n=84)	1.38 (1.32-1.44)	(n=2319)	1
Omfattande omorganisationer	(n=145)	1.21 (1.18-1.24)	(n=2051)	1	(n=76)	1.03 (1.00-1.06)	(n=2185)	1
Upprepad sjuknärvaro	(n=190)	0.98 (0.96-1.00)	(n=2467)	1	(n=86)	1.08 (1.05-1.12)	(n=2329)	1
Tungt kroppsligt arbete	(n=188)	0.69 (0.67-0.73)	(n=2449)	1	(n=83)	a	(n=2161)	1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=191)	1.24 (1.17-1.32)	(n=2469)	1	(n=86)	1.81 (1.71-1.93)	(n=2331)	1
Levnadsvanor								
Daglig rökning	(n=209)	1.12 (1.08-1.17)	(n=2703)	1	(n=86)	1.07 (0.96-1.19)	(n=2418)	1
Fysisk inaktivitet	(n=208)	0.77 (0.75-0.79)	(n=2690)	1	(n=86)	0.82 (0.79-0.85)	(n=2415)	1
Hög alkoholkonsumtion	(n=187)	0.82 (0.79-0.86)	(n=2468)	1	(n=78)	0.84 (0.76-0.93)	(n=2333)	1

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor och för litet antal personer. ² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 4c. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som justerat för åldersklass visar kvoten mellan andel (%) kvinnor jämfört med andel (%)män med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor i en specifik yrkesgrupp med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård och omsorg. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen kvinnor i förhållande till andelen män i den specifika yrkesgruppen med en viss socioekonomisk tillhörighet inom vård- och omsorg rapporterar signifikant mer respektive mindre nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosamma levnadsvana i en aspekt.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) där män inom två yrkesgrupper jämförs med anställda inom annat yrkesområde i motsvarande socioekonomisk grupp.			
	Omvårdnads/omsorg		Läkare	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Hälsa				
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=1163) 1.11 (1.07-1.16)	(n=207) 1	(n=105) 1.99 (1.81-2.19)	(n=85) 1
Ihållande trötthet	(n=1136) 1.40 (1.36-1.44)	(n=205) 1	(n=107) 1.48 (1.39-1.56)	(n=83) 1
Sömnsvårigheter	(n=1134) 1.04 (1.01-1.07)	(n=205) 1	(n=108) 1.42 (1.34-1.50)	(n=83) 1
Oro/nedstämdhet	(n=1121) 1.10 (1.07-1.13)	(n=197) 1	(n=104) 1.63 (1.52-1.75)	(n=79) 1
Stressymptom	(n=1176) 1.18 (1.14-1.22)	(n=210) 1	(n=108) 1.83 (1.74-1.94)	(n=86) 1
Smärtor/besvär ²	(n=1113) 1.36 (1.32-1.40)	(n=191) 1	(n=104) 1.93 (1.81-2.04)	(n=81) 1
Värk i rörelseorganen	(n=1167) 1.84 (1.76-1.93)	(n=210) 1	(n=107) 1.90 (1.74-2.08)	(n=84) 1
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=1090) 1.01 (0.98-1.05)	(n=190) 1	(n=105) 1.09 (0.99-1.19)	(n=86) 1
Arbetsförhållanden				
Högstressarbete	(n=1058) 0.63 (0.59-0.68)	(n=185) 1	(n=105) 1.48 (1.32-1.67)	(n=85) 1
Lågt stöd från överordnade	(n=1042) 1.04 (0.99-1.08)	(n=185) 1	(n=103) 0.71 (0.63-0.79)	(n=76) 1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=1029) 1.18 (1.08-1.29)	(n=177) 1	(n=104) 1.24 (1.09-1.42)	(n=78) 1
Låg belöning	(n=1078) 0.84 (0.82-0.85)	(n=188) 1	(n=104) 1.02 (0.96-1.09)	(n=84) 1
Omfattande omorganisationer	(n=878) 1.03 (1.00-1.05)	(n=145) 1	(n=94) 1.20 (1.16-1.25)	(n=76) 1
Upprepad sjuknärvaro	(n=1080) 1.02 (1.00-1.05)	(n=190) 1	(n=106) 1.29 (1.24-1.34)	(n=86) 1
Tungt kroppsligt arbete	(n=1084) 1.30 (1.24-1.36)	(n=188) 1	(n=105) a	(n=83) 1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=1085) 0.98 (0.92-1.04)	(n=191) 1	(n=106) 1.65 (1.53-1.78)	(n=86) 1
Levnadsvanor				
Daglig rökning	(n=1166) 1.10 (1.06-1.15)	(n=209) 1	(n=108) 0.71 (0.59-0.86)	(n=86) 1
Fysisk inaktivitet	(n=1174) 1.33 (1.30-1.36)	(n=208) 1	(n=107) 1.29 (1.23-1.36)	(n=86) 1
Hög alkoholkonsumtion	(n=1010) 0.54 (0.51-0.56)	(n=187) 1	(n=103) a	(n=78) 1

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor eller ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 5a. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andelen (%) privat- respektive kommunanställda kvinnor inom vård- och omsorg med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andelen (%) landstingsanställda kvinnor inom vård- och omsorg justerat för åldersklass och socioekonomisk indelning. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen privat- respektive kommunanställda kvinnor inom vård- och omsorg som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen landstingsanställda kvinnor inom vård- och omsorg med samma arbetsgivare.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) och socioekonomisk indelning mellan olika arbetsgivare för kvinnor inom vård- och omsorg.		
	Kvinnor		
	Landsting	Kommun	Privat
Hälsa			
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=589) 1	(n=673) 1.36 (1.30-1.41)	(n=393) 1.15 (1.10-1.20)*
Ihållande trötthet	(n=586) 1	(n=662) 1.17 (1.14-1.19)	(n=384) 0.99 (0.96-1.02)*
Sömnsvårigheter	(n=593) 1	(n=657) 1.13 (1.10-1.16)	(n=382) 1.14 (1.11-1.17)
Oro/nedstämdhet	(n=575) 1	(n=656) 1.14 (1.11-1.18)	(n=386) 0.97 (0.94-1.00)*
Stressad	(n=596) 1	(n=682) 1.12 (1.09-1.15)	(n=397) 0.92 (0.89-0.95)*
Smärtor/besvär ²	(n=575) 1	(n=650) 0.98 (0.96-1.00)	(n=387) 0.87 (0.85-0.89)*
Värk i rörelseorganen	(n=585) 1	(n=681) 1.10 (1.07-1.13)	(n=394) 0.86 (0.83-0.89)*
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=596) 1	(n=673) 1.09 (1.06-1.12)	(n=393) 0.94 (0.91-0.98)*
Arbetsförhållanden			
Högstressarbete	(n=585) 1	(n=655) 1.04 (0.96-1.12)	(n=384) 0.75 (0.69-0.82)*
Lågt stöd från överordnade	(n=577) 1	(n=645) 1.35 (1.30-1.41)	(n=378) 1.13 (1.08-1.19)*
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=585) 1	(n=639) a	(n=369) a
Låg belöning	(n=591) 1	(n=664) 1.00 (0.98-1.02)	(n=391) 0.73 (0.71-0.75)*
Omfattande omorganisationer	(n=537) 1	(n=529) 0.89 (0.88-0.91)	(n=338) 0.82 (0.80-0.83)*
Upprepad sjuknärvaro	(n=588) 1	(n=666) 0.98 (0.96-1.00)	(n=390) 0.96 (0.94-0.98)*
Tungt kroppsligt arbete	(n=592) 1	(n=670) 1.45 (1.38-1.51)	(n=392) 1.27 (1.21-1.34)*
Obalans hem/familjeliv & arbete	(n=593) 1	(n=668) 0.98 (0.93-1.03)	(n=392) 0.95 (0.90-1.00)
Levnadsvanor			
Daglig rökning	(n=596) 1	(n=678) 1.42 (1.36-1.48)	(n=388) 1.27 (1.21-1.33)*
Fysisk inaktivitet	(n=593) 1	(n=680) 1.15 (1.13-1.17)	(n=395) 1.02 (1.00-1.04)*
Hög alkoholkonsumtion	(n=548) 1	(n=591) 1.29 (1.19-1.40)	(n=350) 0.94 (0.86-1.03)*

I kolumnen under rubriken Privat innebär en * efter KI att signifikant skillnad i prevalens för problem med hälsoutfallet, arbetsvillkoret eller levnadsvanan föreligger mellan privat- och kommunanställda.

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 5b. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andelen (%) privat- respektive kommunanställda män inom vård- och omsorg med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andelen (%) landstingsanställda män inom vård- och omsorg justerat för åldersklass och socioekonomisk indelning. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen privat- respektive kommunanställda män inom vård- och omsorg som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande och ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen landstingsanställda män inom vård- och omsorg med samma arbetsgivare.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) och socioekonomisk indelning mellan olika arbetsgivare för män.		
	Män		
	Landsting	Kommun	Privat
Hälsa			
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=104) 1	(n=107) 1.14 (1.03-1.26)	(n=88) 1.08 (0.98-1.18)
Ihållande trötthet	(n=102) 1	(n=107) 0.92 (0.85-0.99)	(n=86) 0.70 (0.65-0.75)*
Sömnsvårigheter	(n=103) 1	(n=106) 0.89 (0.83-0.96)	(n=85) 0.59 (0.55-0.64)*
Oro/nedstämdhet	(n=97) 1	(n=104) 1.75 (1.61-1.90)	(n=84) 1.14 (1.05-1.24)*
Stressad	(n=106) 1	(n=108) 1.07 (0.98-1.17)	(n=88) 0.71 (0.65-0.77)*
Smärtor/besvär ²	(n=99) 1	(n=102) 0.73 (0.67-0.78)	(n=80) 0.84 (0.79-0.89)*
Värk i rörelseorganen	(n=106) 1	(n=108) a	(n=86) a
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=106) 1	(n=107) 0.47 (0.42-0.52)	(n=88) 0.51 (0.45-0.56)*
Arbetsförhållanden			
Högstressarbete	(n=106) 1	(n=105) 0.86 (0.73-1.01)	(n=83) 1.30 (1.14-1.49)*
Lågt stöd från överordnade	(n=106) 1	(n=104) 1.80 (1.61-2.01)	(n=82) 1.59 (1.39-1.72)*
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=105) 1	(n=102) a	(n=77) a
Låg belöning	(n=106) 1	(n=106) 0.87 (0.84-0.91)	(n=86) 0.88 (0.84-0.92)
Omfattande omorganisationer	(n=94) 1	(n=78) 0.91 (0.87-0.95)	(n=78) 0.82 (0.78-0.85)*
Upprepad sjuknärvaro	(n=106) 1	(n=107) 0.87 (0.83-0.92)	(n=88) 0.61 (0.58-0.64)*
Tungt kroppsligt arbete	(n=104) 1	(n=106) 3.68 (2.99-4.53)	(n=87) 5.36 (4.36-6.57)*
Obalans hem/familjeliv & arbete	(n=106) 1	(n=108) 0.59 (0.51-0.67)	(n=88) 0.64 (0.57-0.72)
Levnadsvanor			
Daglig rökning	(n=106) 1	(n=107) a	(n=88) a
Fysisk inaktivitet	(n=105) 1	(n=107) 0.74 (0.69-0.79)	(n=87) 0.86 (0.82-0.91)*
Hög alkoholkonsumtion	(n=95) 1	(n=97) 2.10 (1.86-2.38)	(n=82) 1.65 (1.48-1.83)*

I kolumnen under rubriken Privat innebär en * efter KI att signifikant skillnad i prevalens för problem med hälsoutfallet, arbetsvillkoret eller levnadsvanan föreligger mellan privat- och kommunanställda.

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt hälsoutfall, arbetsvillkor eller ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 5c. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som uppdelat på arbetsgivare visar kvoten mellan andel (%) kvinnor inom vård- och omsorg med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andel (%) män inom vård- och omsorg justerat för åldersklass och socioekonomisk indelning. Rödmärkerad respektive grönmärkerad kvot indikerar att andelen kvinnor inom vård- och omsorg med en viss arbetsgivare som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen män inom vård- och omsorg med samma arbetsgivare.

PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) och socioekonomisk indelning som för nedsatt hälsa, negativa arbetsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor visar mäns prevalens i förhållande till kvinnors prevalens uppdelat på arbetsgivare.							
	Landsting		Kommun		Privat		
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	
Hälsa							
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=589) 1.58 (1.46-1.71)	(n=104) 1	(n=673) 1.01 (0.96-1.07)	(n=107) 1	(n=393) 1.00 (0.94-1.08)	(n=88) 1	
Ihållande trötthet	(n=586) 1.19 (1.14-1.25)	(n=102) 1	(n=662) 1.22 (1.18-1.27)	(n=107) 1	(n=384) 1.35 (1.28-1.42)	(n=86) 1	
Sömnsvårigheter	(n=593) 1.21 (1.15-1.27)	(n=103) 1	(n=657) 0.87 (0.84-0.90)	(n=106) 1	(n=382) 1.49 (1.41-1.58)	(n=85) 1	
Oro/nedstämdhet	(n=575) 1.43 (1.35-1.52)	(n=97) 1	(n=656) 0.95 (0.91-0.98)	(n=104) 1	(n=386) 1.25 (1.18-1.33)	(n=84) 1	
Stressad	(n=596) 1.45 (1.38-1.52)	(n=106) 1	(n=682) 0.96 (0.92-1.00)	(n=108) 1	(n=397) 1.30 (1.22-1.38)	(n=88) 1	
Smärtor/besvär ²	(n=575) 1.25 (1.20-1.30)	(n=99) 1	(n=650) 1.48 (1.42-1.55)	(n=102) 1	(n=387) 1.11 (1.06-1.16)	(n=80) 1	
Värk i rörelseorganen	(n=585) 1.88 (1.75-2.02)	(n=106) 1	(n=681) 2.38 (2.22-2.56)	(n=108) 1	(n=394) 1.17 (1.10-1.25)	(n=86) 1	
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=596) 1.22 (1.15-1.29)	(n=106) 1	(n=673) 1.02 (0.98-1.07)	(n=107) 1	(n=393) 1.14 (1.07-1.22)	(n=88) 1	
Arbetsförhållanden							
Högstressarbete	(n=585) 0.88 (0.79-0.98)	(n=106) 1	(n=655) 1.00 (0.90-1.12)	(n=105) 1	(n=384) a	(n=83) 1	
Lågt stöd från överordnade	(n=577) 0.97 (0.89-1.05)	(n=106) 1	(n=645) 0.91 (0.87-0.97)	(n=104) 1	(n=378) 0.99 (0.93-1.07)	(n=82) 1	
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=585) 1.25 (1.10-1.43)	(n=105) 1	(n=639) 0.95 (0.85-1.06)	(n=102) 1	(n=369) a	(n=77) 1	
Låg belöning	(n=591) 0.83 (0.81-0.86)	(n=106) 1	(n=664) 1.00 (0.97-1.03)	(n=106) 1	(n=391) 0.73 (0.71-0.76)	(n=86) 1	
Omfattande omorganisationer	(n=537) 1.10 (1.07-1.13)	(n=94) 1	(n=529) 0.91 (0.88-0.93)	(n=78) 1	(n=338) 1.03 (0.99-1.06)	(n=78) 1	
Upprepad sjuknärvaro	(n=588) 1.08 (1.04-1.11)	(n=106) 1	(n=666) 0.94 (0.91-0.96)	(n=107) 1	(n=390) 1.35 (1.29-1.41)	(n=88) 1	
Tungt kroppsligt arbete	(n=592) a	(n=104) 1	(n=670) 1.42 (1.34-1.52)	(n=106) 1	(n=392) 0.81 (0.75-0.87)	(n=87) 1	
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=593) 1.43 (1.34-1.52)	(n=106) 1	(n=668) 1.09 (1.00-1.18)	(n=108) 1	(n=392) 1.10 (1.00-1.21)	(n=88) 1	
Levnadsvanor							
Daglig rökning	(n=596) a	(n=106) 1	(n=678) 1.20 (1.13-1.27)	(n=107) 1	(n=388) 0.87 (0.81-0.93)	(n=88) 1	
Fysisk inaktivitet	(n=593) 1.15 (1.07-1.15)	(n=105) 1	(n=680) 1.31 (1.27-1.35)	(n=107) 1	(n=395) 1.25 (1.21-1.30)	(n=87) 1	
Hög alkoholkonsumtion	(n=548) a	(n=95) 1	(n=591) 0.44 (0.41-0.47)	(n=97) 1	(n=350) 0.44 (0.41-0.48)	(n=82) 1	

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor eller ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 6a. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andelen (%) privat- respektive kommunanställd kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsvillkor och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andelen (%) landstingsanställd kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal justerat för åldersklass. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen privat- respektive kommunanställd kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen landstingsanställd kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal.

PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) som för kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal visar privat-resp. kommunanställdas prevalens i förhållande till landstingsanställdas prevalens			
Kvinnlig omvårdnads- och omsorgspersonal			
	Landsting	Kommun	Privat
Hälsa			
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=181) 1	(n=593) 1.44 (1.36-1.52)	(n=248) 1.26 (1.18-1.34)*
Ihållande trötthet	(n=180) 1	(n=584) 1.28 (1.24-1.32)	(n=240) 1.09 (1.05-1.13)*
Sömnsvårigheter	(n=182) 1	(n=578) 1.48 (1.42-1.53)	(n=238) 1.48 (1.42-1.54)
Oro/nedstämdhet	(n=174) 1	(n=577) 1.20 (1.16-1.24)	(n=241) 0.99 (0.95-1.03)*
Stressad	(n=184) 1	(n=601) 1.31 (1.26-1.37)	(n=250) 1.00 (0.95-1.05)*
Smärtor/besvär ²	(n=174) 1	(n=570) 1.02 (0.99-1.04)	(n=242) 0.93 (0.90-0.96)*
Värk i rörelseorganen	(n=179) 1	(n=600) 1.25 (1.20-1.29)	(n=248) 1.01 (0.97-1.06)*
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=184) 1	(n=592) 1.27 (1.22-1.32)	(n=246) 0.97 (0.93-1.02)*
Arbetsförhållanden			
Högstressarbete	(n=178) 1	(n=577) 2.13 (1.89-2.40)	(n=246) 1.76 (1.53-2.01)*
Lågt stöd från överordnade	(n=177) 1	(n=564) 1.53 (1.45-1.62)	(n=236) 1.45 (1.36-1.54)*
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=179) 1	(n=559) 1.01 (0.92-1.10)	(n=227) 1.47 (1.33-1.62)*
Låg belöning	(n=184) 1	(n=583) 1.25 (1.21-1.28)	(n=244) 1.02 (0.99-1.06)*
Omfattande omorganisationer	(n=161) 1	(n=457) 0.88 (0.86-0.90)	(n=203) 0.81 (0.79-0.83)*
Upprepad sjuknärvaro	(n=182) 1	(n=587) 1.03 (1.01-1.05)	(n=244) 0.97 (0.95-1.00)*
Tungt kroppsligt arbete	(n=183) 1	(n=589) 1.28 (1.22-1.34)	(n=246) 1.05 (1.00-1.11)
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=185) 1	(n=588) 2.00 (1.83-2.19)	(n=245) 1.89 (1.72-2.09)
Levnadsvanor			
Daglig rökning	(n=184) 1	(n=597) 1.31 (1.25-1.38)	(n=244) 1.37 (1.30-1.45)*
Fysisk inaktivitet	(n=185) 1	(n=600) 1.16 (1.13-1.18)	(n=248) 1.09 (1.06-1.12)*
Hög alkoholkonsumtion	(n=166) 1	(n=516) 1.33 (1.22-1.44)	(n=217) 1.10 (1.00-1.21)*

I kolumnen under rubriken Privat innebär en * efter KI att signifikant skillnad i prevalens för problem med hälsoutfallet, arbetsvillkoret eller levnadsvana föreligger mellan privat- och kommunanställda.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 6b. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som för manlig omvårdnads- och omsorgspersonal visar kvoten mellan kommunanställdas andel (%) jämfört med privatanställdas andel (%) med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsvillkor och ohälsosamma levnadsvanor justerat för åldersklass. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att kommunanställda i förhållande till privatanställda manlig omvårdnads- och omsorgspersonal rapporterar signifikant mer eller mindre nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) som för manlig omvårdnads- och omsorgspersonal visar kommunanställdas prevalens i förhållande till privatanställdas prevalens.	
	Manlig omvårdnads- och omsorgspersonal	
	Kommun	Privat
Hälsa		
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=96) a	(n=49) 1
Ihållande trötthet	(n=96) 1.33 (1.24-1.43)	(n=48) 1
Sömnsvårigheter	(n=95) 1.58 (1.47-1.69)	(n=47) 1
Oro/nedstämdhet	(n=93) 1.37 (1.29-1.47)	(n=46) 1
Stressad	(n=97) 1.57 (1.45-1.70)	(n=49) 1
Smärtor/besvär ²	(n=91) 0.75 (0.70-0.80)	(n=42) 1
Värk i rörelseorganen	(n=97) 0.51 (0.46-0.57)	(n=49) 1
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=96) 1.21 (1.13-1.31)	(n=49) 1
Arbetsförhållanden		
Högstressarbete	(n=95) a	(n=45) 1
Lågt stöd från överordnade	(n=94) 1.36 (1.24-1.50)	(n=47) 1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=92) a	(n=42) 1
Låg belöning	(n=96) 1.00 (0.96-1.04)	(n=48) 1
Omfattande omorganisationer	(n=68) 1.06 (1.00-1.11)	(n=42) 1
Upprepad sjuknärvaro	(n=96) 1.30 (1.24-1.36)	(n=49) 1
Tungt kroppsligt arbete	(n=96) 0.68 (0.62-0.74)	(n=48) 1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=97) a	(n=49) 1
Levnadsvanor		
Daglig rökning	(n=96) 1.00 (0.91-1.09)	(n=49) 1
Fysisk inaktivitet	(n=96) 0.96 (0.91-1.01)	(n=48) 1
Hög alkoholkonsumtion	(n=87) 1.12 (1.02-1.22)	(n=45) 1

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt hälsoutfall eller arbetsvillkor och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 6c. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som visar kvoten mellan andelen (%) privat- respektive kommunanställda kvinnliga sjuksköterskor med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsvillkor och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andelen (%) landstingsanställda kvinnliga sjuksköterskor justerat för åldersklass. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen privat- respektive kommunanställda kvinnliga sjuksköterskor som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen landstingsanställda kvinnliga sjuksköterskor.

PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) som för kvinnliga sjuksköterskor visar privat- resp. kommunanställdas prevalens i förhållande till landstingsanställdas prevalens.						
Kvinnliga sjuksköterskor						
Landsting			Kommun		Privat	
Hälsa						
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=236)	1	(n=37)	1.97 (1.81-2.14)	(n=61)	1.41 (1.29-1.54)*
Ihållande trötthet	(n=233)	1	(n=35)	1.50 (1.40-1.61)	(n=60)	0.94 (0.88-1.00)*
Sömnsvårigheter	(n=236)	1	(n=36)	0.99 (0.92-1.06)	(n=59)	0.97 (0.92-1.03)
Oro/nedstämdhet	(n=228)	1	(n=36)	1.90 (1.79-2.01)	(n=61)	0.71 (0.66-0.78)*
Stressad	(n=237)	1	(n=37)	1.14 (1.06-1.23)	(n=62)	1.07 (0.99-1.15)
Smärtor/besvär ²	(n=229)	1	(n=36)	1.22 (1.16-1.28)	(n=61)	0.87 (0.82-0.92)*
Värk i rörelseorganen	(n=233)	1	(n=37)	1.00 (0.91-1.10)	(n=61)	0.53 (0.48-0.59)*
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=237)	1	(n=37)	0.53 (0.46-0.60)	(n=62)	1.05 (0.97-1.13)*
Arbetsförhållanden						
Högstressarbete	(n=233)	1	(n=35)	a	(n=62)	a
Lågt stöd från överordnade	(n=227)	1	(n=35)	1.19 (1.07-1.32)	(n=62)	0.72 (0.64-0.81)*
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=231)	1	(n=36)	a	(n=62)	a
Låg belöning	(n=233)	1	(n=37)	0.79 (0.74-0.84)	(n=62)	0.62 (0.58-0.66)*
Omfattande omorganisationer	(n=218)	1	(n=32)	0.99 (0.95-1.03)	(n=55)	0.82 (0.79-0.86)*
Upprepad sjuknärvaro	(n=233)	1	(n=35)	0.87 (0.83-0.92)	(n=62)	0.92 (0.88-0.96)
Tungt kroppsligt arbete	(n=234)	1	(n=37)	a	(n=61)	2.11 (1.93-2.53)
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=233)	1	(n=36)	1.05 (0.91-1.21)	(n=62)	1.17 (1.04-1.31)
Levnadsvanor						
Daglig rökning	(n=238)	1	(n=37)	1.41 (1.26-1.58)	(n=61)	0.58 (0.48-0.70)*
Fysisk inaktivitet	(n=235)	1	(n=37)	1.14 (1.10-1.18)	(n=62)	0.95 (0.91-0.99)*
Hög alkoholkonsumtion	(n=217)	1	(n=33)	a	(n=53)	a

I kolumnen under rubriken Privat innebär en * efter KI att signifikant skillnad i prevalens för problem med hälsoutfallet, arbetsvillkoret eller levnadsvana föreligger mellan privat- och kommunanställda.

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor eller ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

Tabell 6d. PPR (Prevalence proportion ratio's) och ett 95-procentigt konfidensintervall (KI) som för landstingsanställda visar kvoten mellan andelen (%) kvinnliga läkare med olika aspekter av nedsatt hälsa, negativa arbetsvillkor och ohälsosamma levnadsvanor jämfört med andelen (%) manliga läkare justerat för åldersklass. Rödmarkerad respektive grönmarkerad kvot indikerar att andelen landstingsanställda kvinnliga läkare som rapporterar nedsatt hälsa, negativt arbetsförhållande eller ohälsosam levnadsvana i en aspekt är signifikant fler respektive färre jämfört med andelen landstingsanställda manliga läkare.

	PPR med 95-procentigt KI justerat för ålder (kategoriskt) som för landstingsanställda läkare visar kvinnors prevalens i förhållande till manligas prevalens.	
	Läkare	
	Kvinnor	Män
Hälsa		
Nedsatt psykiskt välbefinnande	(n=76) 1.90 (1.69-2.13)	(n=47) 1
Ihållande trötthet	(n=77) 1.37 (1.28-1.45)	(n=46) 1
Sömnsvårigheter	(n=78) 1.55 (1.45-1.66)	(n=46) 1
Oro/nedstämdhet	(n=76) 2.24 (2.02-2.50)	(n=43) 1
Stressad	(n=78) 1.87 (1.76-2.00)	(n=48) 1
Smärtor/besvär ²	(n=75) 1.72 (1.60-1.83)	(n=45) 1
Värk i rörelseorganen	(n=77) 1.63 (1.48-1.80)	(n=48) 1
Upprepad korttidsfrånvaro	(n=78) 0.89 (0.81-0.98)	(n=48) 1
Arbetsförhållanden		
Högstressarbete	(n=78) 1.07 (0.95-1.20)	(n=48) 1
Lågt stöd från överordnade	(n=78) 0.86 (0.73-1.00)	(n=48) 1
Lågt stöd från arbetskamrater	(n=78) 0.86 (0.74-1.00)	(n=48) 1
Låg belöning	(n=77) 0.94 (0.87-1.00)	(n=48) 1
Omfattande omorganisationer	(n=67) 1.13 (1.09-1.17)	(n=43) 1
Upprepad sjuknärvaro	(n=78) 1.03 (0.99-1.08)	(n=48) 1
Tungt kroppsligt arbete	(n=78) a	(n=46) 1
Obalans mellan hem/familj & arbete	(n=78) 1.70 (1.56-1.85)	(n=48) 1
Levnadsvanor		
Daglig rökning	(n=78) a	(n=48) 1
Fysisk inaktivitet	(n=77) 1.40 (1.31-1.50)	(n=48) 1
Hög alkoholkonsumtion	(n=74) a	(n=43) 1

a = Inget PPR är beräknat p.g.a. en kombination av ett ovanligt arbetsvillkor eller ovanlig levnadsvana och för litet antal personer.

² = Fråga om smärtor/besvär utan specifik lokalisering (formulär EQ-5D).

På uppdrag av
Stockholms läns landsting



**Karolinska
Institutet**